Capio

Skapad av Nathalie Fredlund Lundroth
Mars 2024

Källor: Viss.nu, Vårdhandboken, Primärvårdskvalitet

Rutin svårläkta sår:

Sår som ej läkt på 5 veckor (svårläkt sår)

Bedömning av ssk/dsk/usk
- **45-min besök**
- **Generella riskfaktorer: bakomliggande sjukdomar (diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt), BMI, nutritionsstatus, fysisk aktivitet, rökning**
- **Foto**
- **Ankeltryck (KVÅ-kod AP032)**

Dokumentera:
- **Sårstatus**
- **Såromläggning**
- **Vidare planering**

Teamrond

Jour-läk

Behandling:
- **Omläggning**
- **Kompressions-behandling vid ord av läkare (KVÅ-kod DP005)**

Uppföljning:
- **Kontinuitet**
- **Inga förändringar av omläggningsmetod utan ny ordination – som dokumenteras**
- **Nytt ankeltryck var 3:e – 6:e månad**
- **Nytt foto var 4:e vecka**
- **Vid ödem mät omkrets av vrist var 4:e vecka**
- **Sårodling (kliniska tecken till infektion) – ord av läk**

Teamrond - vid försämring eller utebliven förbättring

Remiss hudmott – vid sår som ej läkt inom 3 månader eller vid behov