

# Skattning av kardiovaskulär risk för patienter med diabetes typ 2

## Mycket hög risk

- >20% risk enligt NDR
- Sekundärprevention\*
- Mikrovaskulära komplikationer\*\* från minst tre lokaler
- Njurskada: eGFR <45 / eGFR 45-59 med mikroalbuminuri / enbart makroalbuminuri
- Uttalad njurfunktionsnedsättning: eGFR <30 eller eGFR 30-45 med makroalbuminuri

## Hög risk

- 8-20% risk enligt NDR
- eGFR 30-44 / eGFR 45-59 med mikroalbuminuri / eGFR ≥60 ml/min och makroalbuminuri

## Måttlig risk

- 2-8% risk enligt NDR
- <10 års diabetesduration utan aterosklerotiska riskfaktorer

LDL <1,4 mmol/l

LDL <1,8 mmol/l

LDL <2,6 mmol/l

1. Atorvastatin 40-80 mg
2. Byte Rosuvastatin vid ev biverkningar
3. Tillägg Ezetemib 10 mg 1x1

1. Atorvastatin 10-40 mg
2. Byte Rosuvastatin vid ev biverkningar
3. Tillägg Ezetemib 10 mg 1x1

1. Livsstilsförändringar
2. Atorvastatin 10-40 mg

\* TIA/ischemisk stroke, ischemisk hjärtsjukdom, aortasjukdom, perifer artärsjukdom, \*\* retinopati, neuropati, mikroalbuminuri