

AUDIT om "onödig" kontinuerlig PPI behandling Nykvarns vårdcentral 2023

Personnummer

Initialer

Man ☐.

Kvinna ☐

1	Pat aktualiserad vid	Receptförnyelse ☐	Besök ☐	KOMMENTARER
2	Läkemedelsjournalen	Har kontinuerlig aktuell PPI beh sedan		
		1-6 månader ☐	>6 månader ☐	
3	Ord. enligt läkemedelslistan:	Tills vidare ☐	Vid behov ☐	
4	Indikation enligt journal	Ulcus ventr/duodenum ☐ Esofagit, Gastrit, Reflux, GERD ☐ Långvarig NSAID/Kortison beh till riskpat ☐ Funktionell dyspepsi, IBS, ☐ Kortison till icke riskpat ☐ Indikation saknas/annan orsak ☐		
5	Finns ordination dokumenterad i text	Ja kontinuerlig PPI beh ☐	Nej, ordination saknas ☐	
		Ja intermittent PPI beh ☐		
6	Gastroskopi	Gastroskopi gjord ☐	Gastroskopi ej gjord ☐	
7	PATIENT KONTAKTAS Enligt pat tas PPI	Tills vidare ☐	Vid behov ☐	Enligt ordination ☐
8	BEDÖMNING	Rek. att avbryta PPI eller/ta PPI intermittent ☐	Rek. att fortsätta med kontinuerlig PPI beh ☐	
9	Fått nedtrappn.råd	Muntlig ☐	Skriftligt ☐	Inte fått info ☐
10	Pats åsikt om kontinuerlig PPI behandling	Pat vill ändra till vb eller avsluta helt ☐	Pat vill fortsätta med kontinuerlig beh. ☐	
11	Uppföljn 6-8 veckor	Slutat helt ☐	PPI vb ☐	Fortsatt kontinuerl. ☐

FLÖDE

Skriv gärna i kommentarsfältet till höger om informationen i kryssrutorna är ofullständig. Endast de pat som uppges ha kontinuerlig PPI behandling ingår i studien. Huvudspåret är att minska kontinuerlig onödig förskrivning.

- (1) Pat aktualiseras genom receptförnyelse via sköterska eller i samband med läkarbesök
- (2) Läkaren fyller i auditblanketten. Kontinuerlig PPI beh längd syns tydligast i "Alla läkemedel"
- (3) I Im-listan syns om det är tv eller vb.
- (4) Registrera indikation som kan hittas dels i diagnoslistan
- (5) Se om det finns motivering i journalen när PPI sattes in
- (6) Registrera om gastroskopi genomförts och om fynd finns so motiverar PPI
- (7) Pat med kontinuerlig PPI beh kontaktas och får svara på hur de brukar ta PPI. (Ofta skiljer sig ordinationen från hur pat verkligen tar PPI.
- (8) Gör en preliminär bedömning om PPI ordinationen bör ändras.
- (9) . Här kan det vara en sköterska som gör tar vid och lämnar råd om nedtrappning muntligt och skriftligt.
- (10) Pat åsikt om nedtrappning inhämtas.
- (11) Efter 6-8 veckor kontaktas pat och utfallet dokumenteras i auditblanketten

De "magdiagnoser" vi brukar använda på vårdcentralen

K209 Esofagit och K210 GERD med esofagit	25 ggr	0	
K219 GERD utan esofagit		40 ggr	14 ggr
K259 Ventrikelulcus		3 ggr	0
K269? Duodenalulcus		3 ggr	0
K297? Gastrit	59 ggr	14 ggr	

De PPI läkemedel vi förskrivit 2022

Substans	Läkemedel	Antal rec	iter	individer
Omeprazol	Omestad, Omecat, Losec	602	1538	446
Pantoprazol	Pantoloc	27	59	22
Lansoprazol	Lanzo	2	5	1
Esomeprazol	Nexium	195	460	159
SUMMA		826	2062	628